forECast
SERVICIOS CLIMÁTICOS


PERSPECTIVA DE LLUVIA

Noviembre y diciembre de 2026

Emitida el 10 de noviembre de 2026

El Niño extremo se intensifica: noviembre y diciembre excepcionalmente lluviosos en la Costa y la Sierra occidental, y más secos en la cuenca alta amazónica

En octubre el mar frente a Ecuador y Perú estuvo unos 5 °C sobre lo normal, casi 2 °C más caliente que en octubre de 1997, y el calentamiento sigue creciendo en todo el Pacífico ecuatorial. En la Costa, la lluvia de octubre ya superó la de octubre de 1997 en las estaciones que tienen registro de ese año. La zona de convergencia intertropical ya empieza a mostrar su rama sur, cerca del ecuador (entre 1°N y 2°S), mucho antes de lo normal: esa segunda rama suele aparecer en febrero o marzo. Por eso la Costa y la vertiente occidental de la Sierra siguen en el sector de ascenso profundo. Al este de la cordillera, el aire que desciende para compensar ese ascenso deja la cuenca alta amazónica bajo lo normal, como ya ocurrió en octubre, y en la Sierra oriental la lluvia irá de normal a sobre lo normal.



Los límites entre regiones son aproximados; cerca de un límite la lluvia puede parecerse a la de la región vecina.

forECast
SERVICIOS CLIMÁTICOS

Por región

Excepcional: muy por encima de lo normal

Noroccidente
San Lorenzo, Lita, Los Bancos

más de **90 %**
Probabilidad de superar el total de 1997

Excepcional: muy por encima de lo normal

Costa norte
Esmeraldas, Quinindé, Santo Domingo

75 %
Probabilidad de superar el total de 1997

Excepcional: muy por encima de lo normal

Costa centro
Manta, Portoviejo, Quevedo, Babahoyo, Guayaquil, Santa Elena

más de **90 %**
Probabilidad de superar el total de 1997

Excepcional: muy por encima de lo normal

Costa sur
Milagro, Machala, Pasaje

87 %
Probabilidad de superar el total de 1997

Excepcional: muy por encima de lo normal

Sierra occidental norte
Tulcán, Ibarra, Quito, Machachi

89 %
Probabilidad de superar el total de 1997

Excepcional: muy por encima de lo normal

Sierra occidental sur
Guaranda, Alausí, Cañar, Catamayo, Celica

58 %
Probabilidad de superar el total de 1997

Sobre lo normal

Sierra oriental
Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja

Bajo lo normal	Normal	Sobre lo normal
11 %	41 %	48 %

Sobre lo normal es solo un poco más probable que normal.

Bajo lo normal

Amazonía norte y piedemonte
Nueva Loja, Coca, Tena, Puyo

Bajo lo normal	Normal	Sobre lo normal
76 %	19 %	5 %

Sin tendencia clara: las tres categorías son casi igual de probables

Amazonía baja oriental
Shushufindi, Nuevo Rocafuerte

Bajo lo normal	Normal	Sobre lo normal
31 %	32 %	37 %

Bajo lo normal

Amazonía sur
Macas, Zamora

Bajo lo normal	Normal	Sobre lo normal
96 %	4 %	menos de 1 %

Nuestros modelos buscan un equilibrio: distinguir los años normales de los años sobre o bajo lo normal y, al mismo tiempo, captar el comportamiento extremo de los años parecidos a 2026, como 1982 y 1997. Como 2026 va más allá de todo lo observado desde 1982, estas probabilidades son una extrapolación.

La perspectiva de enero y febrero se publicará en forecast.ec/es/estacional dentro de dos o tres días.

Próxima actualización: hacia el 10 de diciembre.